

Proyecto Multicéntrico de Cirugía Bariátrica SCLEDYN: evolución de IMC y complicaciones tras la intervención quirúrgica

S. Laiz Prieto, J. Castañón, L. de la Maza Pereg, P. Álvarez Baños, J.
López Gómez, R. Jiménez, D. de Luis, L. Cuéllar, C. Crespo, A. López
Guzmán, C. Abreu, A. Maldonado, C. Serrano, M. López Pérez, E.

Caballero Renilla

XXXIII CONGRESO SCLEDYN

BURGOS

14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2022

HOTEL NH COLLECTION

PALACIO DE BURGOS



SOCIEDAD CASTELLANO-LEONESA
DE
ENDOCRINOLOGÍA
DIABETES Y NUTRICIÓN



- **Cirugía bariátrica:** prevenir, corregir y controlar las comorbilidades asociadas a la obesidad, mejorando la expectativa y calidad de vida
- **Tipos de técnicas:** Sleeve, Scopinaro, Bypass gástrico (Restrictivas/mixtas)
- **Complicaciones** quirúrgicas y médicas

- Estudio multicéntrico descriptivo

- Beca SCLEDYN 2021

- 249 pacientes operados de cirugía bariátrica en hospitales de CyL


- Hospitales de Burgos, Ávila, Valladolid (Río Hortega y Clínico), Segovia y Palencia

- Evaluar la evolución del IMC al año de la cirugía y sus complicaciones.


- Describir las cirugías más frecuentes según la edad, el IMC y el hospital.



Técnicas quirúrgicas según hospital




Técnicas quirúrgicas






IMC (kg/m²)



Porcentaje de exceso de IMC perdido según la técnica



Media de IMC antes de la cirugía	41,5789 (DE 16,36505)
Media de IMC en hombres	46,1627 (DE 13,49352)
Media de IMC en mujeres	39,7508 (DE 17,07372)
Media de IMC con técnica Scopinaro	45,4276 (DE 16,02757)
Media de IMC con técnica Sleeve	39,8540 (DE 17,82832)
Media de IMC con técnica Bypass	41,1829 (DE 13,73568)

$$\text{EBMIL} = (\text{BMI inicial} - \text{BMI actual} / \text{BMI inicial} - 25) \times 100$$




Complicaciones quirúrgicas

Sí	33	13,25%
No	216	86,75%

Complicaciones quirúrgicas mas frecuentes

- Estenosis de la anastomosis – 5 pacientes
- Eventraciones – 3 pacientes
- Litiasis por oxalato – 3 pacientes
- Otras: coleditiasis, dehiscencias, úlceras, hemorroides

Necesidad de suplementación





- Las técnicas son variables según el centro.
- La técnica de bypass gástrico fue la más utilizada en nuestro hospital
- El mayor PPEIMC se consiguió con Sleeve.
- La cirugía bariátrica no está exenta de complicaciones, siendo una de las más frecuentes la estenosis de la anastomosis.
- Una gran parte de los pacientes necesitó suplementación con vitamina D.

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN



XXXIII
CONGRESO
SCLEDYN

